



*Rosa Rubiginosa anemone-flora.*

*Rosier Rouillé à fleurs Anémone.*

*P. J. Redouté del.*

*Benjamin de Saint-Al.*

*L. Angouj. sculp.*

## LES ROSES.

25

### ROSA RUBIGINOSA

(*anemone-flora.*)

*R. germinibus ovatis subglabris; pedunculis glanduloso-hispidis; foliis subrotundis supra subpubescentibus, subtus glandulosis villisulisque; caule petiolisque aculeatis; floribus 2-5 corymbosis; petalis incarnatis, involutis. (N.)*

*R. Rubiginosa anemone-flora. THY. Prod. groupe XX, spec. 40, var. ζ.*

### LE ROSIER ROUILLÉ,

(à fleurs d'anémone.)

#### DESCRIPTION.

Cet arbrisseau s'élève en buisson à la hauteur de deux ou trois pieds. Les tiges et les rameaux adultes sont garnis d'aiguillons inégaux stipulaires, écartés : ceux des ramuscules de l'année sont en grand nombre, très-rapprochés entre eux. Les feuilles se composent de cinq ou de sept folioles, un peu arrondies, vertes, presque glabres en-dessus, glanduleuses en-dessous et sur leur bordure, doublement dentées, d'une odeur vineuse. Le pétiole qui les supporte, velu, glanduleux, un peu aiguillonné, est muni à sa base de stipules bifides denticulées en leur bord. Les fleurs naissent trois, quatre, et quelquefois plus, à l'extrémité des rameaux, où elles se réunissent en une espèce de corymbe : elles sont portées par des pédoncules hispides-glanduleux. Les tubes des calices sont ovoïdes et